

MASTOIDECTOMY

1. ඔබගේ කණ පැසවීම නිසා කණ අවට ඇති අස්ථිවලට ආසාදනය පැතිර ගොස් ඇත. ශල්‍යකර්මයකින් මෙම නරක්වූ පටක ඉවත් කලයුතුය.
2. මේ සඳහා කණ පිටුපසින් කැපුමක් සිදුකරන අතර ඔබගේ කණ අවට හිසකෙස් කැපීමට සිදුවේ.
3. ඔබගේ මුහුණේ ජේෂ් ක්‍රියාකරවන ස්නායුව (Facial nerve) මොලයෙන් පිටවී කණ තුළින් ගමන් කරන නිසා සැත්කමේදී මෙම ස්නායුවට අනතුරක් සිදුවීමේ අවදානමක් කලාතුරකින් ඇත. මෙම සැත්කම අන්වීක්ෂයකින් බලා ඉතාමත් ප්‍රවේශමෙන් සිදුකරන බැවින් බැවින් ඔබ බිය වියයුතු නැත.
4. මැද කණ සහ අභ්‍යන්තර කණ සම්පයේද සැත්කම සිදුකරන බැවින් සැත්කමෙන් පසු කැරකිල්ලක් සහ වමනයක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. මෙය දින දෙක තුනකින් අවම වියයි.
5. ඔබගේ ශ්‍රවණය, සැත්කමට පසු අවම වී යාමට පුළුවන. සමහරවිට සැත්කමට පසු හොඳින් කණ ඇසීමටද පුළුවන.
(අපගේ මූලික අරමුණ වනුයේ ඔබගේ කණේ ආසාදනය ඉවත්කර මොලයට විෂබීජ ඇතුල්වීමේ අවදානම අවම කිරීමයි)
6. සැත්කමට පසු ඔබගේ කණ සැරහුම් (Crepe Bandage) වලින් වසා තබනු ලැබේ. දින 2කට පසු මේවා ඉවත් කරනු ඇත.
7. ඔබගේ සැත්කමට පසු ප්‍රතිජීවක චිත්තන් කරනු ඇත.
8. රෝහලෙන් පිටවගිය පසු කණ තුලට දැමීමට බෙහෙත් ලැබෙනු ඇත.
9. සතියකට වරක්-මාස 3ක් පමණ සායනයට පැමිණිය යුතුය.
(කණ වියලියාමට මාස 5ක් පමණ ගතවන නිසා)